

Observations du Sieur Lahaye
chirurgien major du Port de Rochefort,
Sur un Perioste ossifié.

Le 12 8bre 1758, monsieur Lechi.^r De H. Jean,
Garde de la marine du Département de Brest,
Embarqué sur la fregatte du Roy, La blonde,
Commandée par monsieur Du Plaiſſy parteau,
En enjambant un Ruisseau, se donna une entorse
au pied droit. La personne chez qui il logeoit,
fit avertir une de ses voisines, qui se mettoit de
Restorer sansy entendre rien; Elle luy tirailla le
pied, auquel il survint beaucoup de gonflement;
Le chirurgien de la fregatte, le négligea;
Cependant il fut saigné deux jours apres et pansé
avec de l'eau de vie. On appella un chirurgien
de la marine, qui Conseilla une autre saignée
et un Cataplasme Emolient et Résolutif, ce qui
fut Exécuté par le Second chirurgien de la
fregatte, entre les mains duquel il Resta.

quelques jour apres Le Capitaine passa chez moy
pour me prier d'aller voir m.^r De H. Jean Son parent;
1^{er} Dépôt... j'y allay L'apres midy; je trouvoy un dépôt sur la
malléole Externe, gros comme la moitié d'un gros
oeuf de poule, qui étoit bon a ouvrir, ce que j'fis
sur le champ; Ce dépôt me parut cutané et être
L'affaire de 15. a 20. jours pour être guery.

Il y avoit du gonflement atout l'article du
pied, au métatarse, et ala jambe, le long de la face
interne du tibia, jus-qu'à la partie moyenne.

Lors que le premier abces paroissoit tendre a sa

- 2.^e Dépot... guérison, il survint un autre dépot, à la partie moyenne inférieure de la face interne du tibia, que j'ouvris, et où je trouvay l'os découvert, de la largeur de six lignes, sur environ quinze lignes de longueur; le malade fut transporté à l'hôpital de la marine.
- 3.^e Dépot... quelques jours après, il se manifesta un autre dépot, proche la malléole externe, presque vis à vis du précédent et un peu plus près de l'articulation; on l'ouvrit et l'on trouva un vuide qui passoit par dessous les muscles extenseurs des orteils, dans le fond duquel l'os se trouva découvert; j'estimay que c'étoit l'angle externe du tibia, proche de la cavité qui reçoit le péroné.
- Dans les premiers jours de guérison, il se forma un autre dépot au dessus de celui cy. quelques jours
- 4.^e Dépot... après il se manifesta un autre à la partie interne un peu postérieurement à celui où l'os étoit découvert, l'angle interne du tibia, se trouva découvert; par la suite ces deux ouvertures communiquèrent par leur fond, dans toute l'étendue de l'os découvert.
- 5.^e Dépot... Enfin il survint un dépot à la partie postérieure de la malléole externe, dont le fond étoit entre le tendon d'Achille, et la partie postérieure du tibia; peu après son ouverture, l'on fut obligé de faire une contre ouverture à la partie interne, pour avoir la facilité de d'éterger son fond, par des injections d'eau vulnéraire.
- 6.^e Dépot... de tous ces dépot, c'est le dernier ouvert qui a été le premier guéri et après luy le premier ouvert.

Il y avoit a l'ouverture du 2.^e de post, un vuide
vers la partie inferieure ou lo^s étoit decouvert de
la largeur d'un travers de doigt; c'étoit par cet
endroit que les deux ouvertures communiquoient,
comme je l'ay fait observer cy dessus, Et dans le
quel on introduisoit un boudon noir plat trempé
dans l'Esprit de vin; On n'avoit pas ouvert ce
vuide, pour ne pas trop approcher de l'article;
néanmoins, voyant la partie Supérieure de
l'Esquille, qui commençoit a se détacher, sans
que l'Exfoliation avançât, je me déterminay
a faire ouvrir le vuide, pour porter le feu sur
cette partie, ainsi que les autres Remedes propres
a procurer l'Exfoliation; mais lorsque l'on eut
passé la Sonde cannelée, pour conduire le
bistouri, cet instrument ne put entrer, le
chirurgien qui faisoit cette ouverture, me dit qu'il
trouvoit une Résistance solide; je pris l'instrument
Et je trouvay ce que l'on m'avoit dit; je pris le
parti de fendre la peau par dessus jus-qu'à la
croûte offeuse que j'avois trouvée; je decouvris cette
croûte de la largeur d'un pouce, sur un pouce
demi de longueur.

Le 22 Janvier 1759. ayant détruit peu a peu cette
croûte, tant par la Ruginé, que par l'application
des Caustiques, j'emportay tout ce qui Restoit de
cette croûte; je fis panser a dillater, Et le
sur landemain je posay le feu sur lo^s; deux
jours apres je m'aperçus que les chairs étoient
détachées le long de l'angle interne; j'y portay
une Sonde avec laquelle je reconnus la face
postérieure du tibia decouverte; dans le même



temps, la cicatrice du 3.^e abcès qui paroissoit solide et qui étoit en partie faite, se rouvrit; L'on trouva un sinus qui permettoit de porter la sonde horizontalement, à quatre travers de doigts de profondeur, sans trouver dans le trajet aucune portion d'os découvert, quoy que le fond parut répondre à la partie postérieure du tibia ou cet os étoit découvert.

Il faut Remarquer que le gonflement de l'article, n'avoit pas diminué, au contraire, tous les différents dépôts l'auoient augmenté considérablement; le pied paroissoit dans une très grande extension sans pouvoir le redresser, faute de mouvement à l'article; les orteils étoient fléchis à toucher le dessous du pied, sans que le malade put les tenir étendus lors que l'on les auoit redressés.

Il survint à la partie antérieure et un peu interne de l'article, à peu près ou passe le tendon du Tarsier antérieur, un petit bouton, gros comme un pois, qui se rouvrit et donna beaucoup de matière, ce qui obligea d'y porter un Stilet qui entra de plus de deux grands travers de doigts et qui auoit sa direction vers la partie antérieure de l'astragale; et dans le fond duquel l'on trouva l'os découvert; ce sinus donnoit beaucoup de supuration dans les pressements, sans que le gonflement de l'article parut céder, au contraire, tout le gonflement paroissoit dur et très solide; pour lors je crus l'article abrégé, les os du tarse cariés et la jambe perdue.

Il y auoit dans l'épaisseur des lames de la

premiere playe interne, plusieurs Endroits ou il restoit
des portions du perioste ossifié, Surtout dans le lambeau
qui restoit entre les deux ouvertures, Et qui étoit dur; je
voulus avant de me déterminer a l'amputation,
Eprouver jus-qu'où la nature pousseroit ses ressourçes;
le Sujet avoit 16 ou 17 ans. je fis faire une Lèxine de
Cendre de Sarmant, dans laquelle on trempa les
Compressees du pied Et de la jambe; j'appliquay trois
fois le feu sur les os ou je pus le porter; je fis toucher
plusieurs fois ces os avec l'eau mercurielle, Et panser
les parties offusées avec le prit de vin rectifié, ne me
servant d'onguent que pour Entretienir un peu de
suppuration. Mais la Satisfaction au bout de quelques
jours d'usage de ce Lèssix devoit les parties
Commencer a se ramollir, le gonflement diminuer,
Et l'articlle avoir un peu de mouvement.
Lors que les choses furent un peu mieux, je fis
appliquer une Semelle de bois, a la plante du pied;
je fis mettre une petite Compresse Epaisse dessous
les orteils pour les tenir relevez, qui étoit soutenue
par la Semelle, qui étoit Elle-même soutenue par
une bande En l'evier, dont les bouts s'attachoient
sur le bandage, a la partie anterieure de la jambe.
enfin il Est sorti du Sinus qui répondoit a l'articlle,
une Ecaille grosse Comme la moitié d'un pois;
plusieurs petites de la partie externe de la jambe;
Et la grande Exfoliation S'est faite le 18 may
1759. Le malade Est sorti de l'hospital, le 2. aoust
suivant, toutes ses playes bien cicatrisées, a la
Reserve de celle de la grande Exfoliation, qui
restoit longue de 5 a 6 lignes, large Et profonde
de environ deux lignes, la jambe Seche Et de
grosseur naturelle, ainsi que l'articlle qui a tout

Son mouvement, les orteils bien Redresser, ayant aussi leurs mouvements; cependant il Sen faut de pres d'un travers de ponce, que le blessé pied: nu, ne fasse toucher le talon a terre, ce que j'ai attribué a la roideur des cicatrices, qui en se Ramollissant, pourront dissiper ce petit inconuenient.

Remarques

Il paroist par L'observation cy dessus, que L'accident de L'Entorse, ainsi que les fortes Extensions Et le maniment trop Rude, fait a cette partie, a donné lieu au gonflement du perioste Et des ligaments de l'articlé; Et que L'engorgement des vaiss.^{es} de cette membrane, Entretenu par son gonflement Et par l'inflammation, a occasionné L'ossification de cette partie; dont La propriété est de Contribuer a la formation des os Et a Celle du Cal dans les fractures.

Ce qui prouve En quelque sorte ce que j'auance, c'est que lors que j'eus decouvert la croûte offeuse du perioste, je la trouuai tres inégale, Raboteuse Et il En sortit beaucoup de Sang, ce qui arriuoit toutes les fois qu'on la Ruginoit; D'ailleurs, il faut observer que cette ossification, n'auoit pas Encore acquis son dernier degré de Solidité, Estant spongieuse et assez Ressemblante a L'extrémité des os des jeunes Sujets.

Observation sur le perioste qui m'aideront a tirer des conséquences, Sur quelques maladies mises au nombre des maladies des os Et qui ne sont que les suites de celle du perioste

En 1741, dans le temps que Mr.^e Duhamel du Monceau, travailloit a son memoire sur les os, il me chargea de faire quelques Recherches sur le perioste; il me tomba entre les mains, un fœtus de 4 a 5 mois que

je difféquay en conséquence; voissy ce que j'observay.

- 1.^o Le perioste me parut plus épais a cet age (proportion gardée) que dans l'adulte.
- 2.^o que les os commençoient leur ossification, par la partie moyenne.
- 3.^o après avoir fait une incision circulaire au perioste, a la partie moyenne du fémur, je l'ay conduit vers les extrémités et j'ay observé qu'il augmentoit d'épaisseur a mesure qu'il approchoit des extrémités.
- 4.^o La première couche du perioste, c'est à dire la plus externe, en approchant du bord de l'épiphyse qui forme les éminences et cavités articulaires, se sépare en deux lames, la plus externe, forme le ligament capsulaire de l'articule; et la plus interne, forme la surface cartilagineuse lisse, qui garnit les éminences et cavités articulaires, ainsi que les ligaments inter articulaires, comme les ligaments croisés, a Ressort &c.
- 5.^o par dessous cette couche du perioste, il y en a une seconde très facile a lever vers les extrémités de l'os, et qui étoit ossifiée dans toute la partie moyenne.
- 6.^o après avoir levé cette seconde couche du perioste jusqu'à l'union de l'épiphyse, l'os se sépare de l'épiphyse, ne faisant qu'une très légère résistance; cette seconde couche restant attachée a l'épiphyse.
- 7.^o par dessous la seconde couche, le corps de l'os, paroïssoit composé de fibres osseuses très peu solides, et séparées les unes des autres, par de petites cannelures très peu profondes.



8.^o les Epiphyses étoient de Consistance de Gelée Solide
Et Rougeâtres.

9.^o En levant le perioste, J'ay aussi enlevé le ligament
interosseux Et toutes les fibres tendineuses qui avoient leurs
attaches à la surface de l'os.

10.^o j'ay Remarqué que les tendons plus considérables, ont
leurs attaches fixes, dans des couches du perioste, plus ou
moins profondes, apparemment, Selon le Degré de
Stabilité dont ils ont besoin; les quels couches venant
à Sossifier, donne aux tendons, un point d'appuy plus
Solide venant à Sossifier luy même avec la couche
du perioste dans laquelle il confond ses fibres.

J'ay aussi Examiné le perioste, dans un veau, dont la
vache avoit avorté à six mois; tout ce que j'ay trouvé
de plus, c'est que dans toute la surface de l'os, la seconde
couche du perioste, étoit encore très molle, En sorte que
l'on passoit le Scalpel par dessous très facilement Et
Sans aucune Résistance; de manière que l'on enlevoit
des lamelles très considérables, tenant encore de la
membrane; le Corps de l'os ne me parut pas plus solide
dans une partie que dans une autre.

Le 8 fevrier, 1742, je dissequay le perioste de la partie
antérieure Et inférieure du fémur d'un adulte, Et
après l'avoir conduit jus-qu'à l'union de l'Epiphise
ou je le trouvay très adhérent, je poussay plus loin
Et j'enlevay le Cartilage qui recouvre l'Epiphise,
ainsy que le ligament capsulaire, que je trouvay
très adhérent tout autour du bord de ce Cartilage,
presqu'à l'endroit de l'union de l'Epiphise
avec le Corps de l'os.

Il y a dans la Salle des dissections de ce Port,
plusieurs Costes ossifiées Ensemble, Sans doute que

Ces Costes auoient estées fracturées l'un même temps,
puis-que le Cal, remplit toutes les Espaces intercostales,
perpendiculairement, Et ne paroist faire qu'un seul
Et même Cal.

il y a aussy dans la même armoire, le tibia du
nommé L'ueille, Soldat de la marine, Compagnie
de Sommevy, mort en 1731. il portoit depuis plus
de 12 ans, un ulcere a la partie inferieure interne
de la jambe droite, dont le fond paroist dur et
calleux; apres sa mort je luy coupay la jambe
pour reconnoistre la cause qui entretenoit cet
ulcere. il auoit la partie inferieure de cette jambe
fort grosse. je trouuay le tibia exostose dans tout
le fond et de la largeur de l'ulcere qui estoit
beaucoup plus large qu'un Ecude de Six Liures; cette
Exostose estoit plate, inegale, et tres Raboteuse; Elle
deborroit la creste et l'angle interne de cet os.

Monsieur Lech.^{re} de Cardillac, garde de la marine,
Embarqué sur la fregate du Roy l'Aquilon, fut
blessé dans le Combat que cette fregate rendit,
Le 17 may 1756. par un coup de mitraille, qui luy
Cassa le Cubitus et le Radius, a la partie moyenne
de l'auant bras droit; il tomba sans presque de
connoissance, le pou tres foible; le gonflement
qui survient presque sur le champ, & qui gagna
jus-qu'à l'épaule, et la foiblese dans laquelle il
estoit, empecha le chirurgien major de la fregate
de luy couper le bras; il fut apporté a l'hospital
de la marine, Le 19.^e la fièvre, l'inflammation, le
gonflement considerable et son état de foiblesse,
ne permit pas de penser a autre chose qu'à
diminuer les accidents, a soutenir ses forces, et



à mettre la playe en supuration le plus tost que l'on
pourroit. Le Cubitus se trouva cassé en trois, de manière
qu'il y avoit une piece de pres de trois travers de doigt de
longueur, qui est sortie par la suite, quoique les chairs
eussent rempli son canal; il a donc fallu que les chairs
fussent divisées par la piece d'or, pour qu'elle put sortir,
Et que les chairs se soyent réunies pour former en place
de la déperdition, un Corps qui la remplacat et qui
est devenu solide, de manière que le blessé a toutes les
facultés de son avant bras, à la réserve de la pronation
et de la supination, qu'il ne peut faire, par la liaison
que le Cal a formé avec le Radius.

Toutes ces observations ainsi que celle du Sieur Dumoulins,
envoyée à l'Académie Royale de chirurgie, le 5^e
Juillet. 1756. m'ont fait conclure;

Premièrement, que le gonflement et la contusion du
perioste, donne lieu à son ossification, puis que sa
propriété est de contribuer à la formation des os, et
à celle du Cal dans les fractures.

2.^e que cette ossification est la Cause des Exostoses et
de l'anchose vray, puis que les ligaments et les
cartilages des articles, sont formés par le perioste.

3.^e que les vieux ulceres, qui ont leur fond proche du
perioste, ne deviennent incurables que par la maladie
de cette membrane.

4.^e que dans toutes les fractures compliquées de playe,
ainsy que dans les coups de feu, ou il y a déperdition
de substance, que cette déperdition est réparée par
le longement des vaisseaux du perioste interne, du
perioste externe, et par ceux qui viennent des extrémités
du Corps de l'os.

5.^e que la proximité de deux os, comme du Cubitus et
du Radius; du tibia, et du peroné; et des Costes, lors qu'il

leurs arrivent fracture, ou qu'elles le sont par des
coups de feu, ou qu'elles éprouvent de fortes contusions,
et ou le périoste de part et d'autre vient à se gonfler
assez pour se toucher, alors cette proximité venant
à s'ossifier, soit par la suite du gonflement ou
par végétation, Remplit l'Entredeux des deux os
et forme un Cal qui lie les parties.

Toutes ces conséquences paroissent prouvées tant
par la dissection du périoste, que par les
observations citées si dessus.



1760

R R

6510w 68344
ARC 89 no 159

13. 8hr 1759.
Leide origa. 12.54.